

香りあって日持ちする、高糖度の緑肉メロン

ハウス春作這栽培用

# ユウカ ・ FR ユウカ

(FR ユウカ,はつる割病レース 0, 2 抵抗性)

# メロン ユウカ・FR ユウカ

特性と栽培ポイント

## 品種特性

- 成熟期には果皮が黄褐色に変わり、芳香がある（ユウカは優香を意味する）。
- 果肉は緑色で極めて厚く、果皮直下まで軟質多汁で可食部率が高い。
- 果型はやや腰高、果重は1.4～1.6kg、糖度は（Brix）16～17になる。
- 軟化しても発酵はしない、収穫後4～7日くらいが食べ頃。
- ユウカはつる割病に抵抗性がない。FR ユウカはレース0と2に抵抗性がある。
- 果皮が緑から黄褐色に変わるので、収穫期の判別が容易。
- 黄化期に離層が発現し、へた落ちの危険があるので立ち栽培に不向き。

## 栽培のポイント

### ■ 作型と栽培様式

関東以西ではハウス、東北・北海道ではハウスまたはトンネルの春這い栽培に適し、子づる2本仕立て、1つる2果、株4果穫りを基本とする。

### ■ 標準施肥量

N 10～12 P 20～25 K 12～15

Ca 50～70 (成分量 kg / 10a) 完熟堆肥 2t/10a

### ■ 着果・灌水

ミツバチ交配を原則とし、灌水は鶏卵大～肥大の完了する開花後40日まで。

### ■ 病虫害対策

ユウカ、FR ユウカともにつる割病レース1, 1・2y, 1・2w, メロンえそ斑点病（MSNV）には抵抗性がないので発生圃場では接ぎ木栽培をおこなう。

（園研メロン台木EM1016が対応）

## 公益財団法人 園芸植物育種研究所

〒270-2221 千葉県松戸市紙敷2-5-1

TEL. 047-387-3827 (代) FAX. 047-386-1455



標準作型

地域	月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
西南暖地 ハウス這栽培		●	★	▽	□							
東海・関東 ハウス這栽培			●	★	▽	□						
東北・北海道 ハウス這栽培				●	★	▽	□					

● 播種 ★ 定植 ▽ 交配 □ 収穫

公益財団法人 園芸植物育種研究所