

メロン台木

EM1016



公益財団法人 園芸植物育種研究所

〒270-2221 千葉県松戸市紙敷 2-5-1

Tel. 047-387-3827 Fax. 047-386-1455

メロン台木 EM1016 <特性と注意点>

品種特性

メロンつる割病菌レース0、1、2に抵抗性、1,2y、1,2wに耐病性、
メロンえそ斑点病（MNSV）抵抗性、うどんこ病にも強い。

- メロン共台なので接ぎ木親和性は完全です。
- 胚軸はやや太く、適度に硬く、接ぎ木作業が容易です。
- 草勢は中位（タカミ、アムス程度）。
- 果実品質は自根栽培と同等です。

栽培の要点

- **呼び接ぎ**では穂木品種より1～3日早く、
挿し接ぎでは5～7日早く
播種することを目安にしてください。

栽培上の注意点

- メロン黒点根腐病、ホモプシス根腐病、紅色根腐病等の土壌病害には抵抗性がないので発生圃場では対策が必要になります。

	つる割病					えそ斑点病
	0	1	2	1,2y	1,2w	MNSV
	抵抗性			耐病性		抵抗性
台木二号	◎	×	◎	×	×	×
台木3号	◎	◎	◎	×	×	×
EM1016	◎	◎	◎	○	○	◎

◎: 抵抗性 ○: 耐病性 ×: 罹病性