



巻きひげのないメロン

千葉県と(財)日本園芸生産研究所の共同育成品種です

農林水産省品種登録 第15778号

TLタカミ



標準作型

地域	月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
西南	ハウス這い栽培	◎	☆	▽			□					
	ハウス立ち栽培		◎	☆	▽		□					
東海	ハウス這い栽培		◎	☆	▽		□					
	・関東 ハウス立ち栽培			◎	☆	▽	□					
東北	ハウス這い栽培			◎	☆	▽	□					
	北海道 大型トンネル				◎	☆	▽	□				

◎ 播種 ☆ 定植 ▽ 交配 □ 収穫

メロン TLタカミ 特性と栽培ポイント

品種特性

- 果実の外観及び栽培特性は「タカミ」と同等のメロンです。
- つるの各節には巻きひげがなく、代わりに枝または葉が発生する。
- 巻きひげがないので整枝、誘引等の管理作業労力が軽減できる。
- ネットの発現期、成熟期の裂果は少ない。
- 果型はやや腰高で、タカミと同等かやや大きく1.4～1.6kg、糖度は（Brix）16～17になる
- 果肉は厚く、しまりがよく、発酵しないので貯蔵輸送性が高い。
- 収穫後5～10日の間が食べ頃で適食期間が長い。
- つる割病（レース0と2），うどんこ病に抵抗性。

栽培のポイント

■ 作型と栽培様式

関東以西ではハウス，東北・北海道ではハウスまたはトンネルの春這い栽培に適し，

子づる2本仕立て，1つる2果，株4果穫りを基本とする。

立栽培は子づる2本仕立て，1つる1果，株2果穫りを基本とする。

巻きひげ由来の枝と葉は摘除する。

■ 標準施肥量

N 10～12 P 20～50 K 12～15

Ca 50～70 （成分量 kg/ 10a） 堆肥 2t /10a

■ 着果・灌水

ミツバチ交配を原則とし，灌水は鶏卵大から肥大の完了する開花後40日まで。

■ 病虫害対策

つる割病レース1，1・2yには抵抗性がないので接木栽培をおこなう。

公益財団法人 園芸植物育種研究所

〒270-2221 千葉県松戸市紙敷2-5-1

TEL. 047-387-3827（代） FAX. 047-386-1455