

香りがあって日持ちする, 高糖度の緑肉メロン
ハウス春作這栽培用

ユウカ(優香)・FRユウカ(優香)

FRユウカは, つる割病 (レース0, 2 抵抗性)



標準作型

地域	月	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
西南暖地 ハウス這い栽培		●		★	▽		□					
東海・関東 ハウス這い栽培			●	★	▽		□					
東北・北海道 ハウス這い栽培				●	★	▽		□				

● 播種 ★ 定植 ▽ 交配 □ 収穫

メロン ユウカ(優香)・FR ユウカ(優香)

特性と栽培のポイント

品種特性

- 成熟期には果皮が黄褐色に変わり、芳香がある(ユウカは優香を意味する)。
- 果肉は緑色で極めて厚く、果皮直下まで軟質多汁で可食部率が高い。
- 果型はやや腰高、果重は1.4~1.6kg、糖度は(Brix)16~17になる。
- 軟化しても発酵はしない、収穫後4~7日くらいが食べ頃。
- ユウカはつる割病に抵抗性がない。FR ユウカはレース0と2に抵抗性がある。
- 果皮が緑から黄褐色に変わるので、収穫期の判別が容易。
- 黄化期に離層が発現し、へた落ちの危険があるので立ち栽培に不向き。

栽培のポイント

■ 作型と栽培様式

関東以西ではハウス、東北・北海道ではハウスまたはトンネルの春這い栽培に適し、子づる2本仕立て、1つる2果、株4果穫りを基本とする。

■ 標準施肥量

N 10~12 P 20~25 K 12~15

Ca 50~70 (成分量 kg / 10a) 完熟堆肥 2t / 10a

■ 着果・灌水

ミツバチ交配を原則とし、灌水は鶏卵大~肥大の完了する開花後40日まで。

■ 病虫害対策

ユウカ、FR ユウカともにつる割病レース1, 1・2y, 1・2w, メロンえそ斑点病(MSNV)には耐病性がないので発生圃場では接ぎ木栽培をおこなう。
(園研メロン台木 **EM1016** が対応)

公益財団法人 園芸植物育種研究所

〒270-2221 千葉県松戸市紙敷 2-5-1

TEL. 047-387-3827 (代) FAX. 047-386-1455